

# DOSES RECOMENDADAS

## PX-Fertil Mo-I



| CULTURAS                     | DOSE (L/Ha)                             | ÉPOCA DA APLICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ALGODÃO                      | 1,0L/100L OU 1,0L/HECTARE               | 1ª APLICAÇÃO: B1 - PRIMEIRO BOTÃO FLORAL VISÍVEL<br>2ª APLICAÇÃO: F2 - ABERTURA DO PRIMEIRO BOTÃO FLORAL NO SEGUNDO RAMO<br>3ª APLICAÇÃO: ESTÁDIO F4/F5<br>4ª APLICAÇÃO: C1 - NO ROMPIMENTO DA PRIMEIRA BOLA EM CAPULHO NO PRIMEIRO RAMO |
| AMENDOIM                     | 1,0L/100L OU 1,0L/HECTARE               | 1ª APLICAÇÃO: B1 - PRIMEIRO BOTÃO FLORAL VISÍVEL<br>2ª APLICAÇÃO: F2 - ABERTURA DO PRIMEIRO BOTÃO FLORAL NO SEGUNDO RAMO<br>3ª APLICAÇÃO: ESTÁDIO F4/F5<br>4ª APLICAÇÃO: C1 - NO ROMPIMENTO DA PRIMEIRA BOLA EM CAPULHO NO PRIMEIRO RAMO |
| ARROZ                        | 1,5L A 2,0L/100L OU 1,5L A 2,0L/HECTARE | APLICAÇÃO 20 DIAS APÓS A EMERGÊNCIA                                                                                                                                                                                                      |
| CANA-DE-AÇÚCAR (PLANTIO)     | 2,0L/100L OU 2,0L/HECTARE               | APLICAÇÃO NO SULCO DE PLANTIO                                                                                                                                                                                                            |
| CANA-DE-AÇÚCAR (SOQUEIRA)    | 2,0L/100L OU 2,0L/HECTARE               | 1ª APLICAÇÃO: 60 DIAS APÓS O CORTE<br>2ª APLICAÇÃO: 120 DIAS APÓS O CORTE                                                                                                                                                                |
| TRIGO                        | 1,5L A 2,0L/100L OU 1,5L A 2,0L/HECTARE | 1ª APLICAÇÃO: 60 DIAS APÓS O CORTE<br>2ª APLICAÇÃO: 120 DIAS APÓS O CORTE                                                                                                                                                                |
| CITRUS                       | 1,0L/100L OU 1,0L/HECTARE               | 1ª APLICAÇÃO: PRÉ-FLORADA - E DE 02 A 03 APLICAÇÕES NA FASE DE BOLA DE GUDE                                                                                                                                                              |
| FLORES E PLANTAS ORNAMENTAIS | 1,0L/100L OU 1,0L/HECTARE               | 2 APLICAÇÕES NA FASE VEGETATIVA, ANTES DA INDUÇÃO FLORAL                                                                                                                                                                                 |
| FUMO                         | 1,0L/100L OU 1,0L/HECTARE               | 1ª APLICAÇÃO: 15 DIAS APÓS O TRANSPLANTE E DE 02 A 03 APLICAÇÕES A CADA 30 DIAS                                                                                                                                                          |
| MANDIOCA (PLANTIO)           | 5,0L/100L                               | PULVERIZAR A MANIVA SEMENTE COM MÁXIMA COBERTURA OU IMERSÃO DA MANIVA                                                                                                                                                                    |
| MANDIOCA                     | 0,2L/100L OU 2,0L/HECTARE               | 1ª APLICAÇÃO: 15 A 20 DIAS APÓS EMERGÊNCIA<br>2ª APLICAÇÃO: PLANTA NA ALTURA DA CINTURA (70cm - 80cm DE ALTURA)                                                                                                                          |
| PASTAGEM                     | 2,0L A 4,0L/100L OU 2,0L A 4,0L/HECTARE | APLICAÇÃO ÚNICA NO INÍCIO DA FASE VEGETATIVA                                                                                                                                                                                             |
| PIMENTÃO                     | 1,0L/100L OU 1,0L/HECTARE               | APLICAÇÕES QUINZENAIS, A PARTIR DO TRANSPLANTIO                                                                                                                                                                                          |
| SORGO                        | 1,5L A 2,0L/100L OU 1,5L A 2,0L/HECTARE | APLICAÇÃO 20 DIAS APÓS EMERGÊNCIA                                                                                                                                                                                                        |
| UVA                          | 0,2L/100L OU 0,8L/HECTARE               | 1ª APLICAÇÃO: 20 DIAS APÓS A PODA INVERNAL E MAIS 04 APLICAÇÕES A CADA 21 DIAS.                                                                                                                                                          |

**MATÉRIA-PRIMA:** PEIXE E SACAROSE. **NATUREZA FÍSICA:** FLUIDO SUSPENSÃO HETEROGÊNEA **EMPALENAMENTO:** ATÉ 2 EMBALAGENS **DILUE 100 % NA ÁGUA DENSIDADE:** 1,15 **VALIDADE:** 24 MESES.  
**AGITAR BEM ANTES DE USAR:** COLOCAR O PX FERTIL EM PRIMEIRO LUGAR NO PREPARO DA MISTURA COM OUTROS FERTILIZANTES. **ARMAZENAR EM LOCAL FRESCO**

**FABRICANTE:** FERTILIZANTES TANAKA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA **ENDEREÇO:** ESTR. MUNICIPAL S/N - B° AREIA VERMELHA, TIETÊ - SP **TELEFONE** (11) 98371-5074 **CNPJ** 06.116.572/0001-17 **INSCR. EST.:** 692.096.023.110  
**REGISTRO DA EMPRESA MAPA/SIPEAGRO:** SP 006124-7 **REGISTRO DO PRODUTO NO MAPA:** SP-80179 10000-7 **INDÚSTRIA BRASILEIRA**